

grand public, ou bien encore une campagne de dépistage, comme cela avait déjà été suggéré en 2016 dans la revue *Médecine des maladies Métaboliques*.⁽²¹⁾

5 Conclusion

En conclusion, avec une prévalence estimée entre 1/500 et 1/200⁽³⁾ l'HFM n'est pas une maladie rare et est la cause d'une morbidité coronarienne importante. Les médecins généralistes sont les premiers acteurs du système de santé, leur rôle est donc fondamental dans le dépistage de cette pathologie, ils en ont d'ailleurs conscience. Cependant, les modalités du dépistage ainsi que les risques encourus par les patients atteints de cette pathologie, lorsqu'ils ne sont pas correctement pris en charge, ne sont pas bien connus de ceux-ci, ce qui peut sembler paradoxal compte tenu du fait qu'ils s'estiment être les professionnels de santé les plus à même de prendre en charge cette maladie. L'utilisation systématique des outils de dépistage existants, la réalisation d'un dépistage en cascade dans une famille dès lors qu'un patient est diagnostiqué voire la généralisation du dépistage systématique par EAL chez l'enfant seraient des solutions permettant d'améliorer la prise en charge de ces patients. De plus, une politique de santé publique plus adaptée au sujet de l'HFM serait nécessaire.

VU et approuvé
Strasbourg, le... 17 MAI 2022
Le Doyen de la Faculté de
Médecine, Maïeutique et Sciences de la Santé
Professeur Jean SIBILLA

VU
Strasbourg, le... 12 mai 2022

Le président du jury de thèse

Professeur... A. PRADIGUAE

